

¿Cuándo debe ir mi hijo con el proveedor?

Su hijo debe ser atendido:

- Si tiene dificultad para respirar.
 - ◊ Hundimiento por encima, por debajo o entre las costillas.
 - ◊ Si respira más de una vez por segundo.
 - ◊ Si tiene dificultad para comer debido a la congestión.
- Si tiene fiebre o una fiebre superior a 101 grados y que no mejora.
- Señales de deshidratación (no tiene lágrimas, boca seca o no moja los pañales en 8 horas).
- Si tiene alguna otra preocupación.



¿Tiene alguna pregunta?

Si tiene alguna pregunta, consulte al médico habitual de su hijo o llame a la línea de **asesoramiento de enfermería de Children's Mercy: (816) 234-3188.**

¿Qué recursos hay disponibles?

Nuestros centros de atención de urgencia están disponibles para Telesalud y para visitas en persona los 7 días de la semana:

- De lunes a viernes, desde mediodía hasta las 10:00 p. m.
- Los fines de semana, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

Las visitas de Telesalud pueden ayudarlo a determinar si su hijo necesita ser atendido para recibir atención en persona.

Seleccione una hora de visita y regístrese en línea en: childrensmercy.org/savemyspot



Children's Mercy es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades/acción afirmativa y es una agencia de United Way. 05/23 Copyright © 2023 The Children's Mercy Hospital. Todos los derechos reservados. 23-EBP-3757

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: El contenido del presente documento tiene por objeto fomentar el conocimiento general del compromiso de la familia con la bronquiolitis y es meramente informativo. Dicha información no pretende sustituir la formación clínica, la experiencia o el criterio de un profesional de atención médica. Las personas y sus familias, no deben usar dicha información como sustituto a la orientación o consejo del profesional médico, terapéutico o de atención médica. NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA POR LEY, CON RESPECTO AL CONTENIDO.



COMPROMISO DE LA FAMILIA CON LA BRONQUIOLITIS

En el ámbito de paciente ambulatorio

¿Qué es la bronquiolitis?

La bronquiolitis es una molestia médica frecuente en niños menores de 2 años. Se trata de una infección viral de las vías respiratorias inferiores. Los pequeños conductos respiratorios de los pulmones (bronquiolos) se llenan de mucosidad, lo que puede dificultar la respiración. Habitualmente es causada por el RSV (virus respiratorio sincitial). También puede ser causada por muchos otros virus.

Comienza con síntomas de "resfriado habitual", como secreción nasal, fiebre y tos. Las sibilancias son muy frecuentes. Es parte de la enfermedad viral y no significa que su hijo tenga asma. La alimentación deficiente puede ser por la congestión nasal o por la dificultad para respirar. La prematuridad o los problemas médicos subyacentes pueden dar lugar a una enfermedad más grave. Muchos niños pueden ser atendidos en casa. Los niños con dificultad para respirar, deshidratación, apatía o que necesitan oxígeno pueden ser hospitalizados.

¿Cómo le diagnosticaron la bronquiolitis a mi hijo?

Los proveedores de atención médica generalmente diagnostican la bronquiolitis hablando con usted sobre la enfermedad de su hijo al mismo tiempo que lo examinan. En la mayoría de los casos, los análisis de sangre, las radiografías y las pruebas para detectar el virus no cambiarán el tratamiento de su hijo. Las pruebas para detectar virus específicos no siempre son precisas.

¿Hay algún medicamento para que mi hijo mejore más rápido?

No hay medicamentos para tratar el virus. Los antibióticos no sirven para tratar los virus. La enfermedad necesita "seguir su curso". Los tratamientos con albuterol no ayudan a todos los pacientes con bronquiolitis. Los medicamentos con esteroides y los medicamentos para la tos/resfriado no son beneficiosos y tienen muchos efectos secundarios.



¿Cómo puedo ayudar a mi hijo en casa?

- Use una jeringa de succión u otro aspirador nasal manual (por ejemplo, Nose-Frida, Nasakleen, etc.) para succionar la mucosidad de la nariz. También puede comprar aparatos eléctricos de succión que pueden facilitar la succión de la mucosidad de la nariz. Ponga 2 gotas de solución salina nasal (agua salada) en cada fosa nasal antes de succionar. Esto puede ayudar a quitar más mucosidad. Succione antes de comer, antes de dormir o si su hijo se ve incómodo.
- Asegúrese de que su hijo tome muchos líquidos. Su hijo puede tomar cantidades más pequeñas de líquido de lo normal. Dele líquidos con más frecuencia.
- No deje que nadie fume cerca de su hijo. Esto puede empeorar sus síntomas.
- El acetaminophen se puede usar para la fiebre y para la irritabilidad. El ibuprofen también se puede usar en niños mayores de 6 meses.
- La tos y la congestión pueden durar varias semanas.
- Lávese las manos a menudo para ayudar a prevenir la transmisión del virus a otras personas.
- Haga un seguimiento con el proveedor de atención médica habitual de su hijo.
- Si tiene alguna pregunta, llame a la línea de asesoramiento de enfermería del Children's Mercy: (816) 234-3188.

